

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**МАСТОДИНОН®**  
**(MASTODYNON®)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить:

<i>Agnus castus</i> Ø (прутняк звичайний)	162 мг;
<i>Caulophyllum thalictroides</i> D4 (стеблелист василистникоподібний)	81 мг;
<i>Cyclamen purpurascens</i> D4 (фіалка пурпурна)	81 мг;
<i>Strychnos ignatia</i> D6 (грудошник гіркий)	81 мг;
<i>Iris versicolor</i> D2 (півник різнобарвний)	162 мг;
<i>Lilium tigrinum</i> D3 (лілея тигрова)	81 мг;

*допоміжні речовини:* крохмаль картопляний, лактози моногідрат, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* круглі плоскі таблетки бежевого кольору, допускаються вкраплення.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Лікарський засіб для застосування в гінекологічній практиці. Під впливом компонентів препарату відбувається зниження концентрації пролактину у крові і проявляється нормалізуюча дія на баланс статевих гормонів.

*Фармакокінетика.*

Дані відсутні.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** У комплексному лікуванні передменструального синдрому: психічна лабільність, головний біль або мігрень, набряки, запори, мастодинія (нагрубання і болючість молочних залоз) перед початком менструації; порушення менструального циклу та фіброзно-кістозна мастопатія.

**Протипоказання.** Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу, включаючи допоміжні речовини. Препарат не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або з порушенням всмоктування глюкози-галактози.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виключена взаємодія з агоністами дофаміну, антагоністами дофаміну, естрогенами та антиестрогенами через можливі дофамінергічні та естрогенні ефекти прутняка звичайного.

*Загальні зауваження.*

На ефективність гомеопатичних препаратів можуть негативно впливати нездоровий спосіб життя, споживання збуджуючих засобів і стимуляторів (наприклад, кофе).

У разі прийому інших препаратів слід звернутися за консультацією до лікаря.

**Особливості застосування.** Пацієнтам, які мають або мали естрогензалежні пухлини, слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням лікарського засобу Мастодинон,<sup>®</sup> таблетки. Застосування таблеток Мастодинон<sup>®</sup> пацієнтам, які застосовують агоністи дофаміну, антагоністи дофаміну, естрогени та антиестрогени, можливо тільки після консультації з лікарем (дивіться розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

У випадку погіршення симптомів під час лікування необхідно звернутися до лікаря.

Пацієнтам, які мають в анамнезі розлади гіпофіза, слід звернутися до лікаря перед застосуванням препаратів, що містять прутняк звичайний.

У разі наявності пролактин-секретуючих пухлин гіпофіза застосування плодів прутняка звичайного може маскувати симптоми пухлини.

Лікарський засіб Мастодинон,<sup>®</sup> таблетки, не слід застосовувати до початку регулярних менструацій у період статевого розвитку.

*Примітка для хворих на діабет.* 1 таблетка препарату Мастодинон<sup>®</sup> містить у середньому 0,020 хлібної одиниці. Лікарський засіб не містить глютену.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Терапевтичних показань для застосування під час вагітності немає, тому не слід застосовувати лікарський засіб під час вагітності.

Дані репродуктивних досліджень вказують на те, що прутняк звичайний (*Agnus castus*) впливає на лактацію. Застосування під час лактації не рекомендується.

Прутняк звичайний (*Agnus castus*) може впливати на жіночу здатність до відтворення потомства, регулюючи менструальний цикл.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Відомостей про безпосередній вплив препарату на керування автотранспортом або іншими механізмами немає. У разі виникнення запаморочення слід утриматися від керування автотранспортом або іншими механізмами.

**Спосіб застосування та дози.** Якщо не призначено інакше, препарат приймати по 1 таблетці двічі на день (вранці і ввечері) з невеликою кількістю води (наприклад, склянкою води).

Якщо симптоми не зникають або посилюються під час застосування лікарського засобу, слід звернутися за консультацією до лікаря.

*Діти.* Немає даних про застосування цього препарату дітям. Дітям та підліткам віком до 18 років не слід застосовувати таблетки Мастодинон<sup>®</sup>.

**Передозування.** При застосуванні великих доз препарату, які значно перевищують рекомендовані, можливі шлунково-кишкові розлади або проносний ефект у хворих із непереносимістю лактози.

*Лікування:* симптоматична терапія.

**Побічні реакції.** Були повідомлення про тяжкі алергічні реакції з набряком обличчя, задишкою та утрудненням ковтання. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипи, свербіж, кропив'янку, головний біль та запаморочення, шлунково-кишкові скарги (такі як нудота, біль у животі), акне, а також порушення менструального циклу.

Застосування гомеопатичних лікарських засобів може призвести до тимчасового посилення наявних симптомів (початкове загострення).

При перших ознаках будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці.  
Для цього лікарського препарату не потрібні будь-які спеціальні температурні умови зберігання.

**Упаковка.** По 20 таблеток у блістері, по 3 (№ 60) або 6 (№ 120) блістерів у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** Біонорика СЕ/ Bionorica SE.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/  
місцезнаходження заявника та/або представника заявника.**

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Німеччина/  
Kerschensteinerstrasse, 11-15, 92318 Neumarkt, Germany.

*Контактні дані представника виробника в Україні ТОВ «Біонорика»:*  
телефон: 044 521 86 00; факс: 044 521 86 01, [info@bionorica.ua](mailto:info@bionorica.ua)

**Дата останнього перегляду.**